QuickShuttle 转染试剂使用信息反馈表

单位名称	中科院动物所	**反馈日期**	20140630
联系人	林**	**联系电话**	6480****
E-mail	L**@ioz.ac.cn	**QQ**	
转染试剂名称	QuickShuttle-Basic	**细胞名称**	HepG2
培养器皿	6 孔板	**培养基名称**	DMEM＋10％FBS
培养基用量	2ml	**立传立转**	是（）否（√）
贴壁后转	是（√）否（）；若选是，传代后（）小时进行转染，细胞汇合度约（80）％		
是否使用低或无内毒素质粒 DNA	是（√）否（）；若选是，请提供质粒提取试剂盒厂家和货号信息：Invitrogen, PureLink HiPure plasmid MidiPrep Kit 货号：K2100-04		
质粒用量	4ug		
转染试剂用量	16ul		
稀释质粒和转染试剂的溶剂	0.15M NaCl，200ul		
分析转染结果的方法	Promega 双荧光素酶报告基因检测试剂盒 E1910		
转染结果描述	荧光素酶活性值活性比较高		
对转染结果是否满意	是（√）否（）	**对本试剂是否满意**	是（√）否（）
是否设置对照试验，并简单描述对照试验	相同量质粒 Lipofectamin 2000 转染组转染后死细胞较 QuickShuttle 组要多，荧光素酶活性值比 QuickShuttle 组要低		
您以前最常用的转染试剂	Lipofectamin 2000		
请您评价一下本试剂与您最常用的转染试剂的优缺点	QuickShuttle 是一款非常适合做荧光素酶活性检测的细胞转染试剂		
对本试剂的建议	暂时没有建议		