QuickShuttle 转染试剂使用信息反馈表

单位名称	北京康乐卫士生物技术股份有限公司	**反馈日期**	20140716
联系人	张**	**联系电话**	1369*******
E-mail	H***@hotmail.com	**QQ**	
转染试剂名称	QuickShuttle-Basic	**细胞名称**	293FT
培养器皿	T75	**培养基名称**	DMEM
培养基用量	25ml	**立传立转**	是（）否（√）
贴壁后转	是（√）否（）；若选是，传代后（24）小时进行转染，细胞汇合度约（50）%		
是否使用低或无内毒素质粒 DNA	是（√）否（）；若选是，请提供质粒提取试剂盒厂家和货号信息：天根生化科技 DP117		
质粒用量	50ug		
转染试剂用量	100ul		
稀释质粒和转染试剂的溶剂	生理盐水，400ul＋400ul		
分析转染结果的方法	（1）通过荧光显微镜观察 GFP 荧光强度估计转染效率；（2）通过病毒滴定计算收获的 HPV 假病毒滴度		
转染结果描述	与对照相比，转染效率更高，假病毒滴度更高		
对转染结果是否满意	是（√）否（）	**对本试剂是否满意**	是（√）否（）
是否设置对照试验，并简单描述对照试验	相同量质粒 Lipofectamin 2000 转染后 GFP 荧光强度较弱，收获的 HPV 假病毒滴度比 QuickShuttle 低大约 30%		
您以前最常用的转染试剂	Lipofectamin 2000		
请您评价一下本试剂与您最常用的转染试剂的优缺点	转染方法比 Lipofectamin 2000 省时省力，更适合批量操作，转染效率更高		
对本试剂的建议	无		